



PERFORMANCE OBJECTIVES
OBJECTIFS DE PERFORMANCE
OBJETIVOS DE RESULTADOS

I66 - G66N - S77 - S77N - S88 - RIR

SLOW GROWTH PARENT STOCK MALE

MÂLE PARENTAL À CROISSANCE LENTE

MACHO REPRODUCTOR DE CRECIMIENTO LENTO




SLOW GROWTH PARENT STOCK MALE: FEEDING AND BODYWEIGHT OBJECTIVES - REARING PERIOD
MÂLE PARENTAL À CROISSANCE LENTE : OBJECTIFS DE RATION ET POIDS VIF - PÉRIODE D'ÉLEVAGE
MACHO REPRODUCTOR DE CRECIMIENTO LENTO: OBJETIVOS DE RACIÓN Y PESO VIVO - PERÍODO DE RECRÍA

Age / Âge / Edad		ME (kcal) EM (kcal)	Ration (g/d) * Ration (g/j) * Ración (g/d) *	Bodyweight (g) Poids vif (g) Peso vivo (g)	Growth (g) Croissance (g) Incremento (g)
Weeks Semaines Semanas	Days Jours Días				
Starter feed / Aliment démarrage / Alimento iniciador (Min. 2 800 kcal ME/kg)					
0	0		Ad libitum		
1	7		Ad libitum	130	
2	14	112	40	250	120
3	21	118	42	380	130
4	28	123	44	500	120
5	35	134	48	640	140
Grower feed / Aliment croissance / Alimento de crecimiento (2 650 kcal ME/kg)					
6	42	138	52	780	140
7	49	148	56	920	140
8	56	159	60	1060	140
9	63	172	65	1200	140
10	70	186	70	1340	140
11	77	199	75	1480	140
12	84	212	80	1620	140
13	91	225	85	1760	140
14	98	239	90	1900	140
15	105	252	95	2 040	140
16	112	265	100	2 180	140
17	119	278	105	2 320	140
18	126	292	110	2 460	140
19	133	305	115	2 600	140
20	140	318	120	2 740	140
21	147	318-331	120-125	2 870	130
22	154	318-331	120-125	3 000	130
23	161			3 120	120
24	168			3 220	100
25	175			3 300	80
26	182			3 380	80
27	189			3 460	80
28	196			3 540	80
29	203			3 620	80
30	210			3 700	80
31	217			3 730	30
32	224			3 760	30
33	231			3 790	30
34	238			3 820	30
35	245			3 850	30
36	252			3 880	30
37	259			3 910	30
38	266			3 940	30
39	273			3 970	30
40	280			4 000	30
41	287			4 010	10
42	294			4 020	10
43	301			4 030	10
44	308			4 040	10
45	315			4 050	10
46	322			4 060	10
47	329			4 070	10
48	336			4 080	10
49	343			4 090	10
50	350			4 100	10
51	357			4 110	10
52	364			4 120	10
53	371			4 130	10
54	378			4 140	10
55	385			4 150	10
56	392			4 160	10
57	399			4 170	10
58	406			4 180	10
59	413			4 190	10
60	420			4 200	10
61	427			4 210	10
62	434			4 220	10
63	441			4 230	10
64	448			4 240	10



Add 4% to these weight objectives if birds are weighed after feeding. / Il faut ajouter 4 % à ces objectifs de poids si les coqs sont pesés après alimentation.
 / Añadir 4 % a estos objetivos de peso si los machos estan pesados después de la alimentación.

*The feed intakes shown are only a guide. Feed amounts need to be adjusted to achieve the bodyweight target. / Ces données sont issues de nos standards. Les rations d'aliment nécessaires doivent être ajustées en fonction des objectifs de poids ciblés. / Estos datos se toman de nuestros estándares. Las raciones de alimentos necesarias deben ajustarse de acuerdo con los objetivos de peso.

SLOW GROWTH PARENT STOCK MALE: DAILY GROWTH CURVE – REARING PERIOD
MÂLE PARENTAL À CROISSANCE LENTE : COURBE DE CROISSANCE JOURNALIÈRE – PÉRIODE D'ÉLEVAGE
MACHO REPRODUCTOR DE CRECIMIENTO LENTO: CURVA DE CRECIMIENTO DIARIO – PERÍODO DE RECRÍA
0-5 WEEKS / SEMAINES / SEMANAS




SLOW GROWTH PARENT STOCK MALE: GROWTH AND UNIFORMITY CURVES – REARING PERIOD
COURBE DE CROISSANCE ET D'UNIFORMITÉ DU MÂLE PARENTAL À CROISSANCE LENTE – PÉRIODE D'ÉLEVAGE
CURVA DE CRECIMIENTO Y DE UNIFORMIDAD DEL MACHO REPRODUCTOR DE CRECIMIENTO LENTO – PERÍODO DE RECRÍA



--- Bodyweight after feeding* / Poids vif après l'alimentation* / Peso vivo después de la alimentación*
 — Bodyweight before feeding / Poids vif avant l'alimentation / Peso vivo antes de la alimentación
 Acceptable range / Plage acceptable / Rango aceptable

* 4-6h after feeding / 4-6h après l'alimentation / 4-6h después la alimentación

SLOW GROWTH PARENT STOCK MALE: GROWTH OBJECTIVES – PRODUCTION PERIOD
MÂLE PARENTAL À CROISSANCE LENTE : OBJECTIFS DE CROISSANCE- PÉRIODE DE PRODUCTION
MACHO REPRODUCTOR DE CRECIMIENTO LENTO: OBJETIVOS DE CRECIMIENTO – PERÍODO DE PUESTA



* 4-6h after feeding / 4-6h après l'alimentation / 4-6h después la alimentación

1. REARING METHOD

To obtain 8–10 % males with uniform maturity at 22 weeks to match the maturity of the females.

1.1. STANDARDS

Maximum density after 4–5 weeks: 5 males / m².

FEEDERS

- Trough: 7.5 m of trough for 100 males.
- Round Ø 35 cm: 1 for 12 males.

DRINKERS

- Round: 1 for 80 males.
- Nipples: 1 for 6–10 males.

1.2. SEPARATION OF THE MALES

Males should be reared separately from the females and separated according to breed. Transversal partitioning of the house is preferable.

Beak trimming is recommended at 9–10 days, especially in open houses or if possible at day old.

1.3. FEED PROGRAMME

0–14 days: ad libitum.

14–21 days: control consumption according to the growth.

After 21 days: follow the restriction programme according to the type of male.

Feed: Follow the performance summary for each specific product.

1.4. BODYWEIGHT CONTROL

Weigh a sample of a minimum of 60 birds each week.

1.5. LIGHTING PROGRAMME

In general it is the same as for the females. In certain conditions it is recommended to stimulate the males 7 or 10 days before the females.

At the end of the rearing period, choose the light intensity depending on the state of maturity between males and females and the male behaviour.

1.6. TRANSFER

The males can be transferred one week before the females in order to advance maturity.

Avoid transferring immature or underweight males and a progressive mixing is highly recommended.

2. MANAGEMENT IN PRODUCTION

2.1. OBSERVE FLOCK BEHAVIOUR

Mixing males and females can be encouraged by distribution of grain in the afternoon.

If males are aggressive or overly active check the percentage of males.

Male sexual maturity:

- if males mature early reduce the number of males;
- if males mature late mix only the mature males.

2.2. BODYWEIGHT CONTROL

Weekly weighing of a minimum of 50 males and adjust the feed allowance accordingly throughout the production period.

Take special care during the first weeks after mixing, as the risk of excessive bodyweight gain is high and this can affect fertility.

1. TECHNIQUE D'ÉLEVAGE

Obtenir 8 à 10 % de mâles de maturité homogène à 22 semaines en concordance avec la maturité des poulettes.

1.1. NORMES

Densité maximum après 4–5 semaines : 5 mâles / m²

MANGEOIRES

- linéaires (7,5 m de chaîne / 100 mâles).
- Circulaire Ø 35 cm : 1 / 12 mâles.

ABREUVOIRS

- Ronds: 1 / 80 mâles.
- Pipettes: 1 / 6–10 mâles.

1.2. SÉPARATION DES MÂLES

Les mâles doivent être élevés séparément des poulettes et par souches distinctes.

Le cloisonnement transversal du bâtiment est préférable.

L'époinçage du bec est souhaitable vers 9–10 jours (en particulier en bâtiment clair).

1.3. PROGRAMME D'ALIMENTATION

0–14 jours : ad libitum.

14–21 jours : stabiliser la ration.

+ 21 jours : suivre le programme de rationnement par type de coq.

Aliment : suivre les formulations prévues dans le tableau de bord spécifique à chaque produit.

1.4. CONTRÔLE DU POIDS

Pesée hebdomadaire d'un échantillon de 60 sujets au minimum

1.5. PROGRAMME LUMINEUX

Identique à celui des femelles. Dans certaines conditions, il est recommandé de stimuler les mâles 7 ou 10 jours avant les femelles.

En fin de période d'élevage, moduler l'intensité en fonction de la bonne concordance de maturité mâles/femelles.

1.6. TRANSFERT

Les coqs peuvent être transférés 1 semaine avant les poules pour activer la maturité.

Eviter de transférer des coqs immatures ou insuffisants en poids.

Un transfert en 2 étapes est recommandé.

2. MANAGEMENT EN PRODUCTION

2.1. COMPORTEMENT

Favoriser le mélange mâles / femelles : distribuer des céréales l'après-midi.

Diminuer l'agressivité des mâles : adapter le pourcentage mâle / femelles.

Maturité sexuelle :

- trop précoce → réduire le pourcentage de mâles.
- tardive → ne mélanger que les coqs les plus matures.

2.2. CONTRÔLE DU POIDS

Peser chaque semaine un minimum de 50 mâles et ajuster la ration d'aliment si besoin.

Faire attention à la première semaine après le mélange car risque de gain de poids élevé pouvant affecter la fertilité.

1. PERÍODO DE CRIA

Para obtener 8–10 % de los machos con una uniformidad uniforme a las 22 semanas para que coincida con la madurez de las hembras.

1.1. ESTÁNDARES

Densidad máxima después de 4–5 semanas: 5 machos / m².

COMEDEROS

- 7,5 m de comederos para 100 machos.
- Ronda Ø 35 cm: 1 para 1 / 12 machos.

BEBEDEROS

- Ronda: 1 para 80 machos.
- Pipeta: 1 para 6–10 machos.

1.2. SEPARACIÓN DE LOS MACHOS

Los machos deberían ser criados por separado de las hembras y separados en función de la genética. La separación transversal del galpón es mejor.

El corte de pico se recomienda en 9–10 días, sobretodo en los galpones abiertos.

1.3. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

0–14 días: a voluntad.

14–21 días: control del consumo en función del crecimiento.

Después de 21 días: seguimiento del programa de restricción en función del tipo del macho.

Comida: seguimiento de la performance para cada producto específico.

1.4. CONTROL DEL PESO

Pesaje de 60 aves mínimo cada semana.

1.5. PROGRAMA DE LUZ

Generalmente es lo mismo que para las hembras. En algunas condiciones, es recomendado de estimular los machos de 7 hasta 10 días antes de las hembras.

Al final del periodo de cría, hay que elegir la intensidad de la luz en función del nivel de madurez y del comportamiento de los machos y de las hembras.

1.6. TRANSFERENCIA

Los machos pueden ser transferidos una semana antes de las hembras, con una madurez avanzada. No se puede transferir los machos inmaduros o los machos con un peso bajo.

Referencias en el guía de manejo.

2. MANEJO EN PRODUCCIÓN

2.1. COMPORTAMIENTO

Mezclar los machos y las hembras se puede hacer en función de la distribución de alimento.

Si los machos son agresivos o muy activos, hay que cuidar el número de machos.

Madurez sexual de los machos:

- madurez temprano: reducir el número de machos;
- madurez tarde: Mezclar solamente los machos avanzados.

2.2. CONTROL DEL PESO

Control del peso de un mínimo de 50 machos y ajustar la cantidad de ración en consecuencia.

Tenga especial cuidado durante las próximas semanas después de la mezcla ya que el riesgo del aumento de peso corporal es alto y puede afectar la fertilidad.



Hubbard

YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT



HUBBARD PREMIUM
the natural choice!

HUBBARD PREMIUM
le choix naturel !

HUBBARD PREMIUM
¡la elección natural!

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET POUR PLUS DE DOCUMENTS

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS DOCUMENTOS

www.hubbardbreeders.com



! The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks, nor any warranty regarding compliance with local legislation regarding health, welfare, or other aspects of animal production. Hubbard makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

! Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des résultats obtenus de nos propres animaux d'expérimentation et des animaux de notre clientèle. Les données de ce document ne sauraient en aucun cas garantir l'obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous ne donnons aucune garantie d'adéquation au but, à la performance, à l'usage, à la nature ou la qualité des animaux, ni aucune garantie de conformité avec les réglementations locales relatives à la santé, au bien-être, ou autres aspects des productions animales. HUBBARD ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans ce document.

! Las cifras de rendimiento suministradas en este documento han sido establecidas a partir de resultados y experiencias obtenidos de nuestras crías o de crías de nuestra clientela. En ningún caso estas cifras podrán constituir una garantía para la obtención de los mismos rendimientos bajo condiciones de nutrición, de densidad o de medio ambiente físico o biológico distintas. En particular (y sin limitación de lo anterior), no otorgamos ninguna garantía con respecto a la aptitud para el propósito, rendimiento, uso, naturaleza o calidad de los lotes. HUBBARD no se hace responsable ni de la exactitud y lo completo de la información contenida en este documento.

AMERICAS
HUBBARD LLC
123 Gallus Rd
PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.
TEL. +1 (423) 447 6224
contact.americas@hubbardbreedersusa.com

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA
HUBBARD S.A.S.
Mauguérand
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 2 96 79 63 70
contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA
HUBBARD S.A.S.
Mauguérand
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 2 96 79 63 70
contact.asia@hubbardbreeders.com

Hubbard is a registered trademark of Hubbard in the US and other countries.
All other brands and trademarks are the trademarks of their respective owners.

© 2026 Hubbard