


RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES

REPRODUCTEURS PARENTAUX
FEMELLES PREMIUM MINI
ET MÂLES



INTRODUCTION	3
1. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES FEMELLES	3
POINTS-CLÉS	3
OBJECTIFS D'APPORTS NUTRITIONNELS JOURNALIERS AU PIC DE PONTE	4
RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES GÉNÉRALES (G/KG POUR 1 000 KCAL D'ÉNERGIE MÉTABOLISABLE)	5
EXEMPLES DE % DE NUTRIMENTS ET DE VALEURS EM POUR DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES (ALIMENTS À BASE DE BLÉ)	6
EXEMPLES DE % DE NUTRIMENTS ET DE VALEURS EM POUR DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES (ALIMENTS À BASE DE MAÏS)	7
EXEMPLES DE % DE NUTRIMENTS ET DE VALEURS EM POUR DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES (CLIMAT CHAUD, FAIBLE INGÉRÉ)	8
2. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES MÂLES	9
3. VITAMINES ET MINÉRAUX	10
4. NUTRITION PENDANT CERTAINES PÉRIODES SPÉCIFIQUES	11
ATTEINDRE L'OBJECTIF DE POIDS À 6 SEMAINES CHEZ LES MÂLES ET LES FEMELLES	11
ALIMENTS REPRODUCTEURS ADAPTÉS SELON LA SOUCHE – JA87 / REDBRO MINI	12
ALIMENTS REPRODUCTEURS ADAPTÉS SELON LA SOUCHE – JA57 / JA57Ki / P6N	13
5. RECOMMANDATIONS SUR LA QUALITÉ PHYSIQUE DE L'ALIMENT	14

INTRODUCTION

Ce document fournit les recommandations nutritionnelles générales et quelques cas pratiques à des situations spécifiques. Le programme nutritionnel optimal pourra varier selon les conditions locales telles que :

- ▷ la disponibilité des ingrédients et leur prix ;
- ▷ l'ingéré alimentaire, le climat ;
- ▷ le type de bâtiment ;
- ▷ le statut sanitaire.

Il est très important de rappeler que la croissance et la ponte sont toutes les deux influencées par l'ingéré nutritionnel mesuré en mg, g ou unité d'énergie par jour. La formule suivante est déterminante pour atteindre l'ingéré en nutriments cible requis à chaque stade d'élevage ou de production :

$$\text{Ingéré Nutriments (g ou kcal/j)} = \text{Ingéré aliment (g/j)} \times \text{Nutriments dans l'aliment (\% ou kcal)}$$



1. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES FEMELLES : POINTS-CLÉS

► Atteindre les objectifs de poids vif à 4 et 6 semaines d'âge est important à la fois pour les femelles parentales Premium Mini et pour les mâles parentaux. L'utilisation d'aliments Pré-démarrage et Démarrage pendant cette période est recommandée afin de garantir l'atteinte de cet objectif. Si ces objectifs de poids vif ne sont pas atteints ou ont historiquement été difficiles à atteindre, il est conseillé d'utiliser les aliments Pré-démarrage et Démarrage pendant une période plus longue. Dans la mesure du possible, éviter un apport excessif de protéines après 8 semaines d'âge, en particulier si le poids vif est conforme à l'objectif ou supérieur à celui-ci.

► Il est normal de donner l'aliment Croissance jusqu'à 1 % ponte. L'aliment Transition (Pré-ponte) n'est pas recommandé car il peut favoriser la croissance et une maturité sexuelle trop précoce. L'aliment Transition n'est recommandé que lorsque le poids vif des femelles est inférieur à l'objectif entre 16 et 18 semaines d'âge et qu'un apport supplémentaire d'aliment est nécessaire pour stimuler la croissance.

► De nombreux producteurs disposent de différentes souches Premium, mais alimenter chaque souche selon ses besoins nutritionnels spécifiques n'est pas toujours possible en pratique, que ce soit à la ferme ou en raison des contraintes de l'usine d'aliments. Pendant la période d'élevage, toutes les souches Premium Mini peuvent être alimentées avec le même programme alimentaire. Les différences entre les besoins des souches, liées à leur production d'œufs, leur poids vif et leur consommation d'aliment, deviennent plus marquées pendant la période de production. Par conséquent, trois scénarios ont été considérés afin d'établir des recommandations nutritionnelles pour les femelles Premium Mini :

- ▷ Scénario 1 : Les volumes d'aliment pour les reproducteurs Premium fabriqués sont faibles et la logistique à l'usine d'aliments est contraignante ; le producteur élève par exemple des JA57 et JA87 ou des JA57Ki et Redbro Mini.

Solution : Toutes les souches Mini utilisent le même programme alimentaire Premium Mini. Ces

recommandations sont une adaptation des recommandations JA57 / JA57Ki et JA87 / REDBRO Mini afin de proposer le meilleur compromis pratique et économique pour assurer une production optimale de poussins. Les tableaux 1 à 5 de ce guide ont été élaborés sur cette base.

- ▷ Scénario 2 : Seules des femelles parentales JA87 ou REDBRO Mini sont élevées.

Solution : Utiliser les recommandations spécifiques pendant la période de production, optimisées pour ces souches – Voir Tableau 10.

- ▷ Scénario 3 : Seules des femelles parentales JA57, JA57Ki ou P6N sont élevées.

Solution : Utiliser les recommandations spécifiques pendant la période de production, optimisées pour ces souches – Voir Tableau 11.

► Cas des femelles parentales REDBRO → Voir les « **Recommandations Nutritionnelles Reproducteurs REDBRO et mâles** ».

► Bien qu'il soit possible d'utiliser chez les femelles Premium Mini des aliments formulés pour des femelles reproductrices conventionnelles pendant la période de poussinière, il est préférable de vérifier leur adéquation avec votre spécialiste technique Hubbard. Pour la période de production, les aliments conçus pour des femelles conventionnelles sont peu susceptibles de convenir aux femelles Premium Mini et présentent un risque d'un apport insuffisant en nutriments, en particulier en acides aminés et en minéraux.



1. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES FEMELLES : OBJECTIFS D'APPORTS NUTRITIONNELS JOURNALIERS AU PIC DE PONTE

La table 1 contient les données clés pour la période critique du pic de ponte qui impacte la nutrition pendant la période de production.

► Les ingrédients nutritionnels journaliers recommandés pour atteindre ou dépasser les objectifs de performances au pic de ponte journalier pour les femelles Premium Mini.
→ Voir « *Objectifs de performances* » de la souche femelle utilisée.

► Les données sur les acides aminés sont fournies sous forme d'acides aminés totaux ou digestibles. L'équilibre optimal recommandé en acides aminés sur une base de la protéine idéale est également indiqué.

► Objectifs d'apports minimaux en calcium et en phosphore disponible. Le phosphore disponible reste l'indicateur le plus largement utilisé dans le monde pour la nutrition des reproducteurs. Des recommandations adaptées pour les systèmes utilisant le phosphore digestible sont disponibles auprès des nutritionnistes Hubbard.

► Les estimations de l'ingéré journalier en énergie métabolisable (EM) sont indiquées en fonction de la température moyenne quotidienne dans le bâtiment car elle influe sur les besoins en EM.

► CALCULS

► Une fois que la teneur en EM de l'aliment Ponte est connue, il est possible d'estimer le pic d'ingéré alimentaire quotidien attendu.

$$366 \text{ kcal (Ingéré EM)} / 2\,750 \text{ kcal/kg (EM aliment)} = 133 \text{ g aliment/d (Ingéré alimentaire)}$$

► En utilisant l'ingéré alimentaire prévu et les objectifs d'apport en nutriments, il est possible de calculer le % de chaque nutriment nécessaire dans la formule. Si les animaux sont exposés à des températures élevées, les besoins énergétiques supplémentaires pour dissiper la chaleur peuvent augmenter les besoins en EM. Ce surplus d'énergie n'est pas facile à prédire.

► De plus, si le poids vif dépasse l'objectif, le besoin d'entretien en EM sera augmenté. À titre indicatif, pour chaque 100 g de poids vif au dessus de l'objectif, les besoins en EM augmentent de 10 kcal par jour ou 0,05 MJ/j.

TABLEAU 1 : OBJECTIFS D'APPORTS NUTRITIONNELS JOURNALIERS POUR LA FEMELLE PARENTALE AU PIC DE PONTE

Acides aminés (mg/sujet/jour)			Protéine idéale	Minéraux (mg/sujet/jour)	
	Tot.	Dig.		Min.	Max.
Lysine	925	825	100	Calcium	4 000
Méthionine	475	425	52	Phosphore dispo.	4 200
Méth. & Cystine	872	776	94		490
Valine	892	776	94		540
Isoleucine	740	645	78		
Arginine	1 065	895	108		
Tryptophane	240	195	24		
Thréonine	710	611	74		

Ingéré en énergie métabolisable (kcal ou MJ/sujet/jour)

Température	°C	15,0	17,5	20,0	22,5	> 25,0
	°F	59,0	63,5	68,0	72,5	> 77,0
JA57 / JA57Ki / P6N	kcal	369	356	344	334	330 à 345
	MJ	1,54	1,49	1,44	1,40	1,38 à 1,44
JA87 / REDBRO Mini	kcal	391	378	366	356	350–365
	MJ	1,64	1,58	1,53	1,49	1,47 à 1,53

Ingéré alimentaire (g/sujet/jour)

Température		°C	15,0	17,5	20,0	22,5	> 25,0
		°F	59,0	63,5	68,0	72,5	> 77,0
Niveau EM dans l'aliment	2 750 kcal/kg	JA57 / P6N / JA57Ki	134	129	125	121	120 à 125
		JA87 / REDBRO Mini	142	137	133	129	127 à 133
	2 850 kcal/kg	JA57 / P6N / JA57Ki	129	125	121	117	116 à 121
		JA87 / REDBRO Mini	137	133	128	125	123 à 128

Objectifs de performances
JA57Ki PS

Objectifs de performances
REDBRO MINI PS

Objectifs de performances
JA57 PS

Objectifs de performances
JA87 PS

Objectifs de performances
P6N PS

1. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES FEMELLES : RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES GÉNÉRALES (G/KG POUR 1 000 KCAL D'ÉNERGIE MÉTABOLISABLE)



► ÉNERGIE MÉTABOLISABLE

- Les recommandations contenues dans ce guide sont conformes aux teneurs en EM des matières premières et ingrédients publiées par la WPSA (1999).
- Il est important de noter qu'il existe des écarts entre les différentes bases de données internationales décrivant la teneur en EM des matières premières. Cela génère des discussions et rend difficile les comparaisons directes de formules ou de recommandations sauf si elles utilisent la même base de données.
- Les objectifs d'apport en EM peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction de nombreux facteurs, de sorte que ce qui est optimal dans un endroit ne le sera peut-être pas ailleurs.

Le tableau 2 montre :

- Exemples de ratio de nutriments pour 1 000 kcal d'EM selon l'âge du lot.
- Les valeurs qui peuvent être utilisées pour calculer la teneur en nutriments de la formule en fonction du niveau d'EM défini en fonction des conditions locales. Par exemple, si une EM de 2 800 kcal/kg est la meilleure option pour la formule Ponte 1, alors la teneur en lysine digestible peut être calculée comme suit :

$$\% \text{ Digestible Lysine} = (2,47 \text{ g dg Lysine/kg} \times 2\,800 \text{ kcal/kg}) / 10\,000$$

► La meilleure façon d'utiliser ce tableau est comme une feuille de calcul. Contactez votre spécialiste technique Hubbard pour de plus amples informations.

► La teneur en EM de chaque formule est présentée avec une plage de valeurs. La teneur optimale en EM de la formule utilisée localement dépend de nombreux facteurs, mais des limites sont indiquées pour chaque formule d'aliment.

Les nutritionnistes Hubbard peuvent aider à déterminer la teneur optimale en EM de chaque aliment dans les conditions locales. À partir de cette valeur, le pourcentage des autres nutriments peut être calculé à l'aide du tableau 2.

Certaines formules présentées sont en option car dépendantes de facteurs locaux tels que la croissance du poussin, le poids d'œuf, un faible ingéré alimentaire etc. Ces choix sont discutés plus en détail dans les sections ultérieures.

TABLEAU 2 : RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES REPRODUCTRICES PARENTALES : G/KG POUR 1 000 KCAL (MCAL) D'ÉNERGIE MÉTABOLISABLE

PHASE		PRÉ-DÉMARRAGE		DÉMARRAGE		CROISSANCE		TRANSITION		MONTÉE EN PONTE		PONTE I		PONTE II*	
Âge (jours)		0 à 28 j ou 35 j		29 ou 36 j à 56 ou 70 j		57 ou 71 j à 126 j ou 1 % ponte		Facultatif 127 j à 1 % ponte		Facultatif 1 % ponte à 56 g poids d'œuf		1% ponte à 60 g de poids d'œuf, 280 j ou réforme. Si utilisation de l'aliment montée en ponte : 56 g de poids d'œuf à 280 j ou réforme.		Facultatif 281 j à la réforme	
EM suggérée	kcal/kg	2 800–3 000		2 750–2 900		2 400–2 900		2 600–2 900		2 650–2 900		2 650–2 900		2 650–2 900	
	MJ/kg	11,70–12,50		11,50–12,10		10,00–12,10		10,90–12,10		11,10–12,10		11,10–12,10		11,10–12,10	
	kcal/lb	1 270–1 360		1 250–1 315		1 090–1 315		1 180–1 315		1 200–1 315		1 200–1 315		1 200–1 315	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		3,80	3,40	3,71	3,32	2,59	2,26	2,62	2,31	2,87	2,55	2,77	2,47	2,71	2,42
Méthionine %		1,75	1,59	1,55	1,40	1,24	1,08	1,25	1,10	1,46	1,32	1,41	1,27	1,37	1,23
Méth. & Cystine %		3,13	2,81	2,80	2,50	2,16	1,88	2,18	1,92	2,54	2,26	2,43	2,16	2,38	2,12
Valine %		3,11	2,73	2,55	2,22	2,00	1,70	2,04	1,73	2,45	2,15	2,40	2,09	2,35	2,05
Isoleucine %		2,58	2,28	2,50	2,21	1,96	1,68	2,00	1,71	2,28	1,98	2,21	1,93	2,16	1,89
Arginine %		4,05	3,65	3,81	3,42	2,70	2,30	2,70	2,30	3,32	2,82	3,18	2,68	3,11	2,62
Tryptophane %		0,73	0,63	0,73	0,62	0,61	0,51	0,62	0,52	0,72	0,60	0,71	0,59	0,70	0,58
Thréonine %		2,65	2,35	2,55	2,22	1,85	1,57	1,86	1,58	2,08	1,79	2,01	1,73	1,97	1,70
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		65,00	69,00	64,00	68,00	54,00	56,00	54,50	56,50	58,00	62,00	57,00	61,00	54,50	59,50
Calcium %		3,60	3,80	3,60	3,70	3,30	3,50	4,50	5,50	11,60	12,00	11,60	12,00	12,00	12,40
Phosphore dispo. %		1,60	1,70	1,50	1,60	1,40	1,50	1,40	1,50	1,44	1,50	1,44	1,50	1,29	1,40
Sodium %		0,60	0,70	0,58	0,70	0,55	0,70	0,55	0,70	0,55	0,70	0,55	0,70	0,60	0,70
Chlorure %		0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80
Potassium %		2,30	2,80	2,30	2,80	2,20	2,80	2,20	2,80	2,20	2,80	2,20	2,80	2,20	2,80
Acide linoléique %		4,10	7,00	4,00	8,00	3,80	8,00	4,40	10,00	6,50	10,00	5,50	10,00	4,50	10,00

* Il est recommandé de passer à l'aliment Ponte II avant 281 jours si le poids d'œuf atteint 58 g (climats chauds/ saison estivale) ou 60 g (climats froids/saison hivernale).

1. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES FEMELLES : EXEMPLES DE % DE NUTRIMENTS ET DE VALEURS EM POUR DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES (ALIMENTS À BASE DE BLÉ)

TABLEAU 3 : EXEMPLES DE SPÉCIFICATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES CLIMATS TEMPÉRÉS (ALIMENTS À BASE DE BLÉ).

PHASE		PRÉ-DÉMARRAGE		DÉMARRAGE		CROISSANCE		TRANSITION		PONTE I		PONTE II*	
Âge (jours)		0 à 28 j		29 j à 56 j		57 j à 126 j ou 1 % ponte		Facultatif 127 j à 1 % ponte		1% ponte à 60 g de poids d'œuf, 280 j ou réforme.		Facultatif 281 j à la réforme	
EM suggérée	kcal/kg	2 850		2 750		2 650		2 700		2 750		2 730	
	MJ/kg	11,93		11,51		11,10		11,35		11,51		11,43	
	kcal/lb	1 293		1 248		1 202		1 230		1 248		1 239	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		1,08	0,97	1,02	0,91	0,69	0,60	0,71	0,62	0,76	0,68	0,74	0,66
Méthionine %		0,50	0,45	0,43	0,39	0,33	0,29	0,34	0,30	0,39	0,35	0,37	0,33
Méth. & Cystine %		0,89	0,80	0,77	0,69	0,57	0,50	0,59	0,52	0,67	0,59	0,65	0,58
Valine %		0,89	0,78	0,70	0,61	0,53	0,45	0,55	0,47	0,66	0,57	0,64	0,56
Isoleucine %		0,74	0,65	0,69	0,61	0,52	0,45	0,54	0,46	0,61	0,53	0,59	0,52
Arginine %		1,15	1,04	1,05	0,94	0,72	0,61	0,73	0,62	0,87	0,74	0,85	0,72
Tryptophane %		0,21	0,18	0,20	0,17	0,16	0,14	0,17	0,14	0,20	0,16	0,19	0,16
Thrénine %		0,76	0,67	0,70	0,61	0,49	0,42	0,50	0,43	0,55	0,48	0,54	0,46
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		18,53	19,67	17,60	18,70	14,31	14,84	14,77	15,31	15,68	16,78	14,88	16,24
Cellulose brute %		2,50	3,50	2,50	3,50	3,50	8,00	3,00	6,00	3,50	6,00	4,00	6,50
Calcium %		1,03	1,08	0,99	1,02	0,87	0,93	1,22	1,49	3,19	3,30	3,28	3,39
Phosphore dispo. %		0,46	0,48	0,41	0,44	0,37	0,40	0,38	0,41	0,40	0,41	0,35	0,38
Sodium %		0,17	0,20	0,16	0,19	0,15	0,19	0,15	0,19	0,15	0,19	0,16	0,19
Chlorure %		0,17	0,23	0,17	0,22	0,16	0,21	0,16	0,22	0,17	0,22	0,16	0,22
Potassium %		0,66	0,80	0,63	0,77	0,58	0,74	0,60	0,76	0,61	0,77	0,60	0,76
Matière grasse %		3,50	4,00	3,50	4,00	2,50	4,00	3,00	4,00	4,00	7,00	3,00	6,50
Acide linoléique %		1,17	2,00	1,10	2,20	1,01	2,12	1,19	2,71	1,51	2,75	1,23	2,73

* Il est recommandé de passer à l'aliment Ponte II avant 281 jours si le poids d'œuf atteint 58 g (climats chauds/ saison estivale) ou 60 g (climats froids/saison hivernale).

Contenu du tableau 3 :

- Exemple de gamme de formules alimentaires à utiliser dans un climat tempéré où la céréale principale est probablement le blé et où des niveaux d'EM plus élevés peuvent être coûteux.
- Dans des conditions normales, les fomules Ponte I et Ponte II seront les seules utilisées pendant la période de production.
- La formule Ponte III n'est pas recommandée pour les femelles Premium Mini en fin de production.

1. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES FEMELLES : EXEMPLES DE % DE NUTRIMENTS ET DE VALEURS EM POUR DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES (ALIMENTS À BASE DE MAÏS)

TABLEAU 4 : EXEMPLES DE SPÉCIFICATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES CLIMATS TEMPÉRÉS (ALIMENTS À BASE DE MAÏS).

PHASE		PRÉ-DÉMARRAGE		DÉMARRAGE		CROISSANCE		TRANSITION		PONTE I		PONTE II*	
Âge (jours)		0 à 35 j		36 j à 70 j		71 j à 126 j ou 1 % ponte		Facultatif 127 j à 1 % ponte		1% ponte à 60 g de poids d'œuf, 280 j ou réforme.		Facultatif 281 j à la réforme	
EM suggérée	kcal/kg	2850		2750		2675		2775		2850		2825	
	MJ/kg	11,93		11,51		11,20		11,50		11,93		11,83	
	kcal/lb	1293		1248		1214		1259		1293		1282	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		1,08	0,97	1,02	0,91	0,69	0,60	0,73	0,64	0,79	0,70	0,77	0,68
Méthionine %		0,46	0,41	0,43	0,39	0,33	0,29	0,35	0,31	0,40	0,36	0,39	0,35
Méth. & Cystine %		0,83	0,74	0,77	0,69	0,58	0,50	0,61	0,53	0,69	0,62	0,67	0,60
Valine %		0,74	0,66	0,70	0,61	0,54	0,45	0,57	0,48	0,68	0,59	0,66	0,58
Isoleucine %		0,73	0,64	0,69	0,61	0,52	0,45	0,55	0,48	0,63	0,55	0,61	0,53
Arginine %		1,14	1,02	1,05	0,94	0,72	0,62	0,80	0,70	0,87	0,77	0,84	0,75
Tryptophane %		0,21	0,18	0,20	0,17	0,16	0,14	0,17	0,14	0,20	0,17	0,20	0,16
Thrénine %		0,74	0,64	0,70	0,61	0,49	0,42	0,51	0,44	0,57	0,49	0,56	0,48
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		18,53	19,67	17,60	18,70	14,45	14,98	15,12	15,68	16,25	17,39	15,40	16,81
Cellulose brute %		2,50	3,50	2,50	3,50	3,50	8,00	3,00	6,00	3,50	6,00	4,00	6,50
Calcium %		1,03	1,08	0,99	1,02	0,88	0,94	1,25	1,53	3,31	3,42	3,39	3,50
Phosphore dispo. %		0,46	0,48	0,41	0,44	0,37	0,40	0,39	0,42	0,41	0,43	0,36	0,40
Sodium %		0,17	0,21	0,16	0,19	0,15	0,19	0,15	0,19	0,16	0,20	0,17	0,20
Chlorure %		0,17	0,24	0,17	0,22	0,16	0,21	0,17	0,22	0,17	0,23	0,17	0,23
Potassium %		0,66	0,74	0,63	0,72	0,59	0,75	0,61	0,78	0,63	0,80	0,62	0,79
Matière grasse %		2,50	4,00	3,00	4,00	2,50	4,00	3,00	6,00	4,00	8,00	3,50	7,00
Acide linoléique %		1,17	2,00	1,10	2,20	1,02	2,14	1,22	2,78	1,57	2,85	1,27	2,83

* Il est recommandé de passer à l'aliment Ponte II avant 281 jours si le poids d'œuf atteint 58 g (climats chauds/ saison estivale) ou 60 g (climats froids/saison hivernale).

Contenu du tableau 4 :

- Exemple de gamme de formules alimentaires à utiliser lorsque la céréale principale est le maïs et que les formules contiennent peu d'autres matières premières. Le soja pourra être généralement la seule source principale de protéines.
- Dans ces conditions, la teneur optimale en EM des formules est plus élevée surtout en période de production. Cette teneur plus élevée en EM peut également permettre d'ajouter davantage d'huile ou de matière grasse dans la formule pour la rendre plus appétente et réduire le stress lié à des épisodes de chaleur.
- La formule Ponte III n'est pas recommandée pour les femelles Premium Mini en fin de production.

1. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES FEMELLES : EXEMPLES DE % DE NUTRIMENTS ET DE VALEURS EM POUR DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES (CLIMAT CHAUD, FAIBLE INGÉRÉ)

TABEAU 5 : EXEMPLES DE SPÉCIFICATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES CLIMATS CHAUDS (> 25 °C) OU LORSQUE L'INGÉRÉ AU PIC EST < 90 % DE L'OBJECTIF (-10 G/J)*

PHASE		ALIMENTS À BASE DE BLÉ AVEC HUILE AJOUTÉE				ALIMENTS À BASE DE MAÏS AVEC HUILE AJOUTÉE			
		PONTE I		PONTE II**		PONTE I		PONTE II**	
Âge (jours)		1 % ponte à 280 j		281 j à la réforme		1 % ponte à 280 j		281 j à la réforme	
EM suggérée	kcal/kg	2 750		2 730		2 850		2 825	
	MJ/kg	11.51		11.43		11.93		11.83	
	kcal/lb	1 248		1 239		1 293		1 282	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		0,81	0,72	0,78	0,70	0,84	0,75	0,81	0,72
Méthionine %		0,41	0,37	0,40	0,36	0,43	0,38	0,41	0,37
Méth. & Cystine %		0,71	0,63	0,69	0,61	0,73	0,65	0,71	0,63
Valine %		0,70	0,61	0,68	0,59	0,72	0,63	0,70	0,61
Isoleucine %		0,64	0,56	0,63	0,55	0,67	0,58	0,65	0,56
Arginine %		0,93	0,78	0,90	0,76	0,96	0,81	0,93	0,79
Tryptophane %		0,21	0,17	0,20	0,17	0,22	0,18	0,21	0,17
Thréonine %		0,59	0,51	0,57	0,49	0,61	0,52	0,59	0,51
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		16,62	17,78	15,77	17,22	17,22	18,43	16,32	17,82
Cellulose brute %		3,50	6,00	4,00	6,50	3,63	6,22	4,14	6,73
Calcium %		3,38	3,50	3,47	3,59	3,50	3,63	3,59	3,71
Phosphore dispo. %		0,42	0,44	0,37	0,41	0,44	0,45	0,39	0,42
Sodium %		0,16	0,20	0,17	0,20	0,17	0,21	0,18	0,21
Chlorure %		0,17	0,23	0,17	0,23	0,18	0,24	0,18	0,24
Potassium %		0,64	0,82	0,64	0,81	0,66	0,85	0,66	0,84
Matière grasse %		4,00	8,00	3,50	7,00	4,15	8,29	3,62	7,24
Acide linoléique %		1,60	2,92	1,30	2,89	1,66	3,02	1,35	2,99

* Ces valeurs sont données à titre indicatif. En cas de faible consommation d'aliment, consultez votre spécialiste technique Hubbard pour déterminer la solution la plus adaptée.

** Il est recommandé de passer à l'aliment Ponte II avant 281 jours si le poids d'oeuf atteint 58 g (climats chauds/ saison estivale) ou 60 g (climats froids/saison hivernale).

Le tableau 5 montre un exemple de formules d'une gamme utilisée dans des conditions pour lesquelles l'ingéré d'EM est prévue d'être faible en raison, par exemple, d'une température ambiante élevée en bâtiments ouverts. L'hypothèse ici est qu'un faible apport en EM et par conséquent un faible ingéré alimentaire va limiter l'ingéré de tous les autres nutriments qui n'atteindront pas les objectifs présentés dans le tableau 1.

► Des formules d'aliment en ponte à teneur élevée en EM (> 2 825 kcal/kg) sont recommandées dans les cas où l'environnement peut réduire les besoins énergétiques ou réduire l'ingéré d'énergie. L'objectif est de fournir un minimum de 10 % de l'apport énergétique sous forme d'énergie lipidique qui est plus facilement atteint dans des formules à haute teneur en EM. Ces dernières limitent aussi le volume de l'ingéré d'aliment dans des conditions difficiles.

► Par rapport aux tableaux 3 et 4 qui décrivent des situations où l'apport énergétique pendant la phase de ponte est normal, les teneurs des nutriments de la table 5 ont été augmentées vu que l'ingéré énergétique est inférieur à l'objectif. Le but est d'essayer de garantir un apport réel en nutriments le plus proche de l'objectif.

► Si l'ingéré d'aliment et d'énergie est inférieur à l'objectif, il existe alors une limite à l'augmentation de la teneur des nutriments. Ceci est notamment vrai pour les acides aminés où une augmentation de plus de 6 % du ratio acide aminé : énergie n'est pas recommandée. En effet, l'effet positif d'une augmentation des acides aminés est peu probable si l'apport d'énergie est limitant pour la production d'œufs. Enfin, l'énergie utilisée pour éliminer l'excès de protéines sera probablement amplifiée dans des climats chauds.

► L'augmentation de la quantité de matières grasses et d'huiles ajoutées peut également améliorer l'appétence des aliments sous forme de farine. La méthode pour atteindre cet objectif d'augmentation de l'énergie lipidique dépendra des matières premières disponibles et du fait que les aliments soient à base de blé ou de maïs.

▷ Des options sont présentées pour des aliments soit à base de blé à plus faible énergie (2 750 kcal/kg), soit à base de maïs à plus forte énergie (2 850 kcal/kg).

▷ Dans la plupart des cas où la température dépasse souvent 25 °C (78 °F), les options Ponte I et II à plus forte énergie seront privilégiées.

▷ Lorsque les aliments sont à base de blé, la manière la plus efficace d'augmenter l'ingéré pendant la ponte est de distribuer l'aliment en miettes ou en granulés, tout en maintenant une qualité physique optimale et constante.

▷ Pour les aliments à base de maïs, la farine grossière est l'option privilégiée.



2. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES MÂLES

TABEAU 6 : EXEMPLE DE SPECIFICATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES MÂLES

PHASE		MÂLE 1		MÂLE 2 FACULTATIF	
Âge (jours)		141 jours à la réforme ou 141 à 210 jours		211 jours à la réforme	
EM suggérée	kcal/kg	2 800		3 000	
	MJ/kg	11,72		12,56	
	kcal/lb	1 270		1 361	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		0,49	0,42	0,47	0,41
Méthionine %		0,26	0,23	0,25	0,22
Méth. & Cystine %		0,46	0,40	0,44	0,38
Valine %		0,42	0,35	0,40	0,34
Isoleucine %		0,40	0,34	0,38	0,33
Arginine %		0,55	0,49	0,52	0,45
Tryptophane %		0,12	0,10	0,12	0,10
Thréonine %		0,38	0,32	0,36	0,31
		Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		11,62	12,18	10,80	11,25
Cellulose brute %		4,00	6,50	4,00	6,50
Calcium %		0,92	0,98	0,99	1,05
Phosphore dispo. %		0,39	0,42	0,42	0,45
Sodium %		0,15	0,21	0,17	0,23
Chlorure %		0,17	0,22	0,18	0,24
Potassium %		0,62	0,78	0,66	0,84
Matière grasse %		3,00	6,50	3,00	6,50
Acide linoléique %		1,12	2,52	1,20	2,70

► ALIMENT POUSSINIÈRE

Les aliments utilisés pendant la période d'élevage peuvent être utilisés à la fois pour les mâles et pour les femelles. Dans certains cas, cela peut poser des difficultés pendant la période de démarrage ou lorsque les sexes sont élevés séparément, comme indiqué à la page 11.

► ALIMENT PRODUCTION

Il est recommandé de distribuer aux mâles un aliment spécifique comme indiqué dans le tableau 6. Ces dernières années, une nouvelle stratégie a été développée pour les mâles en utilisant une formule d'aliment riche en EM et avec une teneur en protéines inférieure. Cela permet aux mâles de maintenir un ingéré énergétique suffisant sans augmenter le risque de dépôt musculaire excessif sur le bréchet. Une alternative à l'utilisation exclusive de l'aliment Mâle 1 consiste en une approche en deux phases :

- Aliment Mâle 1 : assurer que la croissance hebdomadaire jusqu'à 28-30 semaines d'âge soit conforme à l'objectif (en utilisant un aliment mâle).
- Aliment Mâle 2 à partir de 30 semaines d'âge ou plus tard pour ralentir la croissance et ainsi atteindre les objectifs de croissance hebdomadaire en utilisant des aliments avec une faible teneur en protéines et une teneur en énergie plus élevée.

L'aliment Mâle 2 est facultatif et est destiné aux mâles conventionnels M77 ou M99. L'utilisation de ce type d'aliment peut être nécessaire lorsqu'il est difficile de contrôler le dépôt musculaire sur le bréchet et que l'ingéré d'énergie doit être maintenu. → Voir Objectifs de performances « *Mâle M77 croisé avec des femelles Premium* » & Objectifs de performances « *Mâle M99 croisé avec des femelles Premium* ».

Il est conseillé de contacter votre spécialiste technique Hubbard pour discuter de cette option avant d'utiliser l'aliment Mâle 2. Le recours à cette formule d'aliment est déconseillé si :



- le poids vif des mâles est inférieur à l'objectif entre 24 et 30 semaines d'âge ;
- la croissance hebdomadaire est lente et irrégulière ;
- il existe d'autres problèmes affectant la consommation d'aliment comme une pathologie, une exposition à des températures élevées ou une mauvaise qualité de distribution de l'aliment.
- ce régime alimentaire n'est pas recommandé pour les mâles à croissance intermédiaire ou lente.



i

Objectifs de performances
Mâle M77 croisé avec des
femelles premium

Objectifs de performances
Mâle M99 croisé avec des
femelles premium

3. VITAMINES ET MINÉRAUX

TABLEAU 7 : RECOMMANDATIONS EN VITAMINES

Taux d'inclusion par kg d'aliment		Poussinière	Ponte et mâles reproducteurs
Vitamine A	UI	12 000	13 000
Vitamine D3	UI	4 000	5 000
Vitamine E	IU	100	130
Vitamine K (ménadione)	mg	5,0	7,5
Thiamine B1	mg	4,0	5,0
Riboflavine B2	mg	14	16
Acide pantothénique	mg	15	22
Acide nicotinique	mg	60	65
Pyridoxine B6	mg	6,0	8,0
Acide folique B10	mg	3,0	4,0
Cyanocobalalamine B12	mg	0,040	0,055
Biotine Vit. H	mg	0,30	0,45
Choline	mg	750	750

- 1. Lorsque la réglementation locale en vigueur le permet, les niveaux de vitamines pourront être augmentés de 10 % si des baisses de consommation d'aliment de 10 % ou plus en dessous de l'objectif sont observées ou attendues.
- 2. Vérifier la réglementation locale afin de connaître le niveau maximal autorisé pour chaque vitamine et particulièrement les vitamines A et D.
- 3. Ces recommandations devront être ajustées si les conditions de traitement thermique utilisées sont difficiles (> 85 °C pendant plus de 5 minutes). Veuillez consulter un nutritionniste Hubbard.



TABLEAU 8 : RECOMMANDATIONS EN MINÉRAUX

Minéral		Taux d'inclusion par kg d'aliment
Manganèse	mg	100
Fer	mg	50
Iode	mg	2
Cuivre	mg	10
Zinc	mg	100
Sélénium	mg	0,30-0,40

- 1. Tenir compte des sources de minéraux organiques et inorganiques.
- 2. Vérifier la réglementation locale afin de connaître le niveau maximal autorisé pour chaque minéral mais particulièrement pour le zinc et le sélénium.



4. NUTRITION PENDANT CERTAINES PÉRIODES SPÉCIFIQUES : ATTEINDRE L’OBJECTIF DE POIDS À 6 SEMAINES CHEZ LES MÂLES ET LES FEMELLES

- Dans certains cas, il peut être nécessaire d’élever les mâles et les femelles séparément ou dans des bâtiments distincts. Si les femelles ont besoin des aliments Pré-démarrage et Démarrage pendant une période plus longue afin d’atteindre les objectifs de poids vif, il existe un risque d’apport excessif de protéines pour les mâles après 6 semaines, en particulier pour les mâles M77 et M99.
- ▷ Dans cette situation, et si la logistique le permet, des recommandations spécifiques pour les mâles durant les 6 premières semaines peuvent être appliquées, comme indiqué dans le tableau 9.
- ▷ Il est important de veiller à ce que les mâles suivent les objectifs de performances spécifiques, y compris pour les mâles conventionnels, car ces objectifs sont adaptés lorsqu’ils sont croisés avec des femelles Premium.
- ▷ Pendant la période de poussinière, les mâles à croissance intermédiaire et lente sont généralement alimentés avec les mêmes aliments que les femelles.



TABLEAU 9 : EXEMPLE DE SPÉCIFICATIONS NUTRITIONNELLES POUR DES MÂLES ÉLEVÉS EN SÉPARÉ DES FEMELLES PREMIUM MINI

PHASE		PRÉ-DÉMARRAGE		DÉMARRAGE	
Âge (jours)		0 à 21 j		29 j à 42 j	
EM suggérée	kcal/kg	2 850		2 750	
	MJ/kg	11,93		11,51	
	kcal/lb	1 293		1 248	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		1,08	0,97	0,87	0,78
Méthionine %		0,50	0,45	0,36	0,33
Méth. & Cystine %		0,89	0,80	0,65	0,58
Valine %		0,89	0,78	0,60	0,52
Isoleucine %		0,74	0,65	0,58	0,52
Arginine %		1,15	1,04	0,89	0,80
Tryptophane %		0,21	0,18	0,17	0,15
Thréonine %		0,76	0,67	0,60	0,52
		Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		18,53	19,67	14,96	15,90
Cellulose brute %		2,50	3,50	2,50	3,50
Calcium %		1,03	1,08	0,99	1,02
Phosphore dispo. %		0,46	0,48	0,41	0,44
Sodium %		0,17	0,20	0,16	0,19
Chlorure %		0,17	0,23	0,17	0,22
Potassium %		0,66	0,80	0,63	0,77
Matière grasse %		3,50	4,00	3,50	4,00
Acide linoléique %		1,17	2,00	1,10	2,20

4. NUTRITION PENDANT CERTAINES PÉRIODES SPÉCIFIQUES : ALIMENTS REPRODUCTEURS ADAPTÉS SELON LA SOUCHE – JA87 / REDBRO MINI

- Lorsque des souches JA87 ou REDBRO Mini sont utilisées, il est possible d'adapter les aliments afin de mieux répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque souche.
- Des recommandations spécifiques pour les souches JA87 et REDBRO Mini sont présentées dans le tableau 10. Celles-ci sont adaptées, selon les cas, aux conditions tempérées lorsque la consommation d'aliment normale est atteinte au pic de production, ou aux conditions chaudes lorsque la consommation d'aliment est inférieure aux attentes en raison de la conduite d'élevage ou d'autres facteurs.

TABEAU 10 : EXEMPLES DE SPÉCIFICATIONS NUTRITIONNELLES AUX FEMELLES PARENTALES JA87 OU REDBRO MINI

PHASE		CONDITIONS TEMPÉRÉES				CONDITIONS CHAUDES OU FAIBLE INGESTION D'ALIMENT			
		PONTE I		PONTE II*		PONTE I		PONTE II*	
Âge (jours)		1 % ponte à 280 j		281 j à la réforme		1 % ponte à 280 j		281 j à la réforme	
EM suggérée	kcal/kg	2 750		2 730		2 850		2 825	
	MJ/kg	11,51		11,43		11,93		11,83	
	kcal/lb	1 248		1 239		1 293		1 282	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		0,72	0,65	0,70	0,63	0,79	0,71	0,77	0,69
Méthionine %		0,37	0,33	0,36	0,32	0,41	0,36	0,39	0,35
Méth. & Cystine %		0,63	0,56	0,62	0,55	0,70	0,62	0,68	0,60
Valine %		0,63	0,55	0,61	0,53	0,69	0,60	0,67	0,58
Isoleucine %		0,58	0,50	0,56	0,49	0,63	0,55	0,61	0,54
Arginine %		0,83	0,70	0,81	0,68	0,91	0,77	0,89	0,75
Tryptophane %		0,19	0,15	0,18	0,15	0,20	0,17	0,20	0,16
Thrénine %		0,53	0,45	0,51	0,44	0,58	0,50	0,56	0,48
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		14,89	15,94	14,13	15,43	16,36	17,51	15,50	16,93
Cellulose brute %		3,50	6,00	4,00	6,50	3,45	5,91	3,93	6,39
Calcium %		3,19	3,30	3,28	3,39	3,33	3,44	3,41	3,53
Phosphore dispo. %		0,40	0,41	0,35	0,38	0,41	0,43	0,37	0,40
Sodium %		0,15	0,19	0,16	0,19	0,16	0,20	0,17	0,20
Chlorure %		0,17	0,22	0,16	0,22	0,17	0,23	0,17	0,23
Potassium %		0,61	0,77	0,60	0,76	0,63	0,80	0,63	0,80
Matière grasse %		4,00	7,00	3,00	6,50	3,94	7,88	3,44	6,88
Acide linoléique %		1,51	2,75	1,23	2,73	1,58	2,87	1,28	2,84

* Il est recommandé de passer à l'aliment Ponte II avant 281 jours si le poids d'oeuf atteint 58 g (climats chauds/ saison estivale) ou 60 g (climats froids/ saison hivernale).



4. NUTRITION PENDANT CERTAINES PÉRIODES SPÉCIFIQUES : ALIMENTS REPRODUCTEURS ADAPTÉS SELON LA SOUCHE – JA57 / JA57Ki / P6N

- Lorsque des souches JA57, P6N ou JA57Ki sont utilisées, il est possible d'adapter les aliments afin de mieux répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque souche.
- Des recommandations spécifiques pour les souches JA57, P6N ou JA57Ki sont présentées dans le tableau 11. Celles-ci sont adaptées, selon les cas, aux conditions tempérées lorsque la consommation d'aliment normale est atteinte au pic de production, ou aux conditions chaudes lorsque la consommation d'aliment est inférieure aux attentes en raison de la conduite d'élevage ou d'autres facteurs.

TABEAU 11 : EXEMPLES SPÉCIFICATIONS NUTRITIONNELLES AUX FEMELLES PARENTALES JA57, JA57Ki OU P6N

PHASE		CONDITIONS TEMPÉRÉES				CONDITIONS CHAUDES OU FAIBLE INGESTION D'ALIMENT			
		PONTE I		PONTE II*		PONTE I		PONTE II*	
Âge (jours)		1 % ponte à 280 j		281 j à la réforme		1 % ponte à 280 j		281 j à la réforme	
EM suggérée	kcal/kg	2 750		2 730		2 850		2 825	
	MJ/kg	11,51		11,43		11,93		11,83	
	kcal/lb	1 248		1 239		1 293		1 282	
Acides aminés min.		Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine %		0,78	0,70	0,76	0,68	0,86	0,77	0,84	0,75
Méthionine %		0,40	0,36	0,39	0,35	0,44	0,39	0,42	0,38
Méth. & Cystine %		0,69	0,61	0,67	0,60	0,76	0,67	0,73	0,65
Valine %		0,68	0,59	0,66	0,58	0,75	0,65	0,72	0,63
Isoleucine %		0,62	0,55	0,61	0,53	0,69	0,60	0,67	0,58
Arginine %		0,90	0,76	0,88	0,74	0,99	0,83	0,96	0,81
Tryptophane %		0,20	0,17	0,20	0,16	0,22	0,18	0,22	0,18
Thréonine %		0,57	0,49	0,55	0,48	0,63	0,54	0,61	0,52
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine brute %		16,15	17,28	15,32	16,73	17,74	18,98	16,81	18,35
Cellulose brute %		3,50	6,00	4,00	6,50	3,74	6,40	4,26	6,93
Calcium %		3,19	3,30	3,28	3,39	3,61	3,73	3,70	3,82
Phosphore dispo. %		0,40	0,41	0,35	0,38	0,45	0,47	0,40	0,43
Sodium %		0,15	0,19	0,16	0,19	0,17	0,22	0,19	0,22
Chlorure %		0,17	0,22	0,16	0,22	0,19	0,25	0,19	0,25
Potassium %		0,61	0,77	0,60	0,76	0,68	0,87	0,68	0,86
Matière grasse %		4,00	7,00	3,00	6,50	4,27	8,54	3,73	7,46
Acide linoléique %		1,51	2,75	1,23	2,73	1,71	3,11	1,39	3,08

* Il est recommandé de passer à l'aliment Ponte II avant 281 jours si le poids d'oeuf atteint 58 g (climats chauds/ saison estivale) ou 60 g (climats froids/ saison hivernale).



5. RECOMMANDATIONS SUR LA QUALITÉ PHYSIQUE DE L'ALIMENT

Il est important d'assurer une qualité physique constante de l'aliment à tous les âges pour garantir un comportement alimentaire adéquat. Des recommandations sont données dans la tableau ci-dessous pour les miettes, farine et granulés.

- La farine grossière est l'option privilégiée pour les formules Croissance, Transition, Ponte et Mâles.
- L'utilisation d'un tamis pour contrôler la qualité physique des aliments est fortement recommandée. → Voir « Outil granulométrie Hubbard ».
- Les pourcentages indiqués dans la tableau ci-dessous correspondent aux quantités de chaque catégorie de particule après passage dans les tamis 3, 2 et 1 mm obtenues grâce au tamis Hubbard. Quel que soit le type d'aliment, il est important que le pourcentage d'aliment passant à travers le tamis 1 mm ne dépasse pas les valeurs indiquées.
- Si un tamis de 0,5 mm est utilisé pour analyser une farine, un maximum de 10 % devra passer à travers ce dernier.

i


Outil granulométrie
Hubbard

TABLEAU 12 : RECOMMANDATIONS SUR LA QUALITÉ PHYSIQUE DE L'ALIMENT


MIETTES				
	> 3 mm	2-3 mm	1-2 mm	< 1 mm
Démarrage – Bonne qualité	0 %	40 %	55 %	5 %
Démarrage – Qualité moyenne	10 %	40 %	40 %	10 %
Croissance/Ponte	50 %	30 %	10 %	10 %

FARINE				
	> 3 mm	2-3 mm	1-2 mm	< 1 mm
Démarrage	5 %	25 %	50 %	20 %
Croissance	10 %	35 %	35 %	20 %
Ponte	15 %	40 %	30 %	15 %

GRANULÉS				
	> 3 mm	2-3 mm	1-2 mm	< 1 mm
Croissance/Ponte	> 70 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %



Qualité physique de la miette dans la trémie d'aliment : taille correcte des particules



Qualité physique de la miette dans la chaîne d'alimentation après un tour d'aliment : trop de particules fines





Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des résultats obtenus de nos propres animaux d'expérimentation et des animaux de notre clientèle. Les données de ce document ne sauraient en aucun cas garantir l'obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous ne donnons aucune garantie d'adéquation au but, à la performance, à l'usage, à la nature ou à la qualité des animaux, ni aucune garantie de conformité avec les réglementations locales relatives à la santé, au bien-être, ou autres aspects des productions animales. Hubbard ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans ce document.



AMÉRIQUES
HUBBARD LLC
123 Gallus Rd
PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.
TÉL. +1 (423) 447 6224
contact.americas@hubbardbreedersusa.com

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
HUBBARD S.A.S.
Mauguérand
22800 LE FOEIL – FRANCE
TÉL. +33 2 96 79 63 70
contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIE
HUBBARD S.A.S.
Mauguérand
22800 LE FOEIL – FRANCE
TÉL. +33 2 96 79 63 70
contact.asia@hubbardbreeders.com

Hubbard est une marque déposée de Hubbard aux États-Unis et dans d'autres pays.
Toutes les autres marques sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© 2026 Hubbard