

DÉMARRAGE DES POUSSINS

Stimuler la consommation d'eau et d'aliment dès l'arrivée des poussins.

LUMIÈRE

- Lumière homogène.
- 50 lux minimum durant les 7 premiers jours.
- Du premier au 4^{ème} jour : si possible programme cyclique 3h30 jour / 30min nuit (ou sinon 24h de lumière).
- Début du programme lumineux au 5^{ème} jour.


ALIMENT

- 1 point d'alimentation accessible pour 50 à 70 poussins.
- Papier au sol avec aliment sur 40 - 50 % de la surface.
- Aliment frais (type miette démarrage), rajouts réguliers pour stimulation de l'appétit.
- Palpation du jabot : après 24h, 96 % des sujets avec un jabot rempli et souple.
- Retrait du papier au 3^{ème} ou 4^{ème} jour.



TEMPÉRATURE

- Température ambiante au démarrage : 32 - 34 °C.
- Baisse régulière et progressive de la température pour atteindre 30 - 31 °C à 7 jours.




DENSITÉ / LITIÈRE

- Densité à la mise en place : 25 - 40 sujets / m².
- Préchauffer la litière à 30 °C (24 à 72 heures).
- Litière bien nivelée pour faciliter les déplacements :
 - ▷ 1 à 2 kg / m² de copeaux ou équivalent sur sol bétonné.
 - ▷ 4 à 5 kg / m² de paille hachée ou équivalent sur sol en terre battue.

EAU

- 1 abreuvoir de démarrage pour 50 à 70 poussins ou 1 pipette pour 10 - 15 poussins.
- Eau fraîche 1 heure avant la mise en place.
- pH idéal compris entre 5,5 et 6,8 avec un potentiel Redox optimal de 600 mV et / ou un niveau de chlore libre en bout de ligne de 0,5 ppm.
- Pipettes : contrôle de la hauteur et de la pression.
- Abreuvoirs : niveau d'eau maxi à l'arrivée.



ÂGE EN JOURS		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TEMPÉRATURE	Sous radiants	36-38				34-36				32-34						
	Zone de vie	32-34	32-33	31-32	31-32	30-31				0,3 °C par jour						
	Ambiance	30-34	30-33	30-32	30-32											
HYGROMÉTRIE	%	45-55				50-60				50-65						
TAUX MINI DE RENOUVELLEMENT D'AIR	m ³ /kg/heure*	≥ 1,5				≥ 1,4	≥ 1,3	≥ 1,2	≥ 1,1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
ÉQUIPEMENTS	Points d'eau	1 abreuvoir rond / 50 sujets 1 pipette pour 10-15 sujets				1 abreuvoir rond pour 100 sujets / 1 pipette pour 10-15 sujets										
	Point d'alimentation	1 point d'alimentation pour 50-70 sujets + papiers				1 point d'alimentation pour 50-70 sujets										
DENSITÉ	Poussins/m ²	25-40				25-35				15-25						
LUMIÈRE**	Poulets de moins de 2 kg (h)	6 X (3,5 heures de lumière + 30 mn d'obscurité ou absence de lumière artificielle)				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Poulets de 2 kg et plus (h)					20	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
	Intensité (lux)	50								40	35	30	25	20	15	10

* Le taux de renouvellement d'air pourra être beaucoup plus élevé que les chiffres indiqués dans le tableau si les poussins sont placés sur de la litière accumulée (production d'ammoniac de la litière) ou dans un climat chaud et humide.

** Se référer en 1^{er} lieu à la réglementation applicable.