

MANAGEMENTS DES REPRODUCTEURS

Hubbard
YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT

BREEDING
FOR YOU
SINCE 1921

DISTRIBUTION DE L'ALIMENT AVEC DES CHAINES PLATES

Assurer une distribution homogène de l'aliment pour de meilleurs taux de ponte et de viabilité, et une bonne homogénéité.

PÉRIODES CLÉS :

- ENTRÉE EN PONTE QUAND LES AUGMENTATIONS D'ALIMENT SONT QUOTIDIENNES.
- APRÈS LE PIC DE PONTE LORSQUE LA QUANTITÉ D'ALIMENT PEUT ÊTRE DIMINUÉE.

PROCÉDURE :

1. S'ASSURER QUE LE DÉBIT D'ALIMENT EST IDENTIQUE SUR TOUS LES CIRCUITS DE CHAINES ET QUE L'ESPACE À LA MANGEOIRE EST SUFFISANT (15 CM/ FEMELLE REDBRO ET EFFICIENCY PLUS ET 12-14 CM/SUJET POUR LES FEMELLES PREMIUM MINI).
2. CHRONOMÉTRER LE TEMPS POUR QUE L'ALIMENT FASSE UN TOUR COMPLET SUR TOUS LES CIRCUITS (EX : 4 MINUTES.)
3. POUR UNE BONNE GESTION DU DERNIER TOUR D'ALIMENT, DEUX POSSIBILITÉS EXISTENT :
 - SOIT LA TRÉMIE DOIT SE VIDER EN 4 MINUTES PRÉCISÉMENT, SAUF SI UNE PERSONNE ASSISTE AU DERNIER TOUR D'ALIMENT.
 - SOIT IL DOIT RESTER 5 KGS D'ALIMENT DANS LA TRÉMIE APRÈS 4 MINUTES DE DISTRIBUTION (RÈGLE À SUIVRE SI PERSONNE NE PEUT ASSISTER À LA DISTRIBUTION D'ALIMENT.)



COMMENT SAVOIR SI LA DISTRIBUTION D'ALIMENT LORS DU DERNIER TOUR EST CORRECTEMENT RÉALISÉE ?

