MANEJO DE LOS REPRODUCTORES

Hubbard
YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT
BREEDING FOR YOU SINCE 1921

ARRANQUE DE LOS POLLITOS

Estimular el apetito y consumo de agua para adquirir el peso fisiológico

LUZ

- Luz homogénea.
- 60 lux mínimo durante los primeros días.
- 24 h de luz el primer día o si es posible programa cíclico 2 h 30 luz / 30 min oscuro.
- La disminución de la intensidad y duración de luz, como se indica en la siguiente tabla.

DENSIDAD/ DISTRIBUCIÓN

- Densidad al alojamiento: 25 - 30 aves / m².
- Dar espacio a los pollitos en 3 etapas.
- La distribución de los pollitos debe ser uniforme en todo el parque.

ALIMENTO

- 1 punto de alimentación para 50 a 70 pollitos
- Alimento fresco (tipo migaja de inicio), adiciones regulares para la estimulación de apetito
- Papel en el suelo con alimento sobre el 50 % de la superficie
- Inicio de utilización de las cadenas de alimentación de 6 a 8 días
- Palpación del buche. Después de 24 h, 95 % de los aves con un buche lleno y suave

TEMPERATURA

- 1 criadora para 500 pollitos Temperatura ambiente al inicio : 31 - 32 °C
- Disminución constante y gradual de la temperatura hasta llegar a 20 °C a las 5 semanas

AGUA

- 1 bebedero de inicio para 50 a 70 pollitos.
- Agua de los bebederos a temperatura ambiente (24 - 26 °C).
- pH ideal entre 6 y 6,8 con un potencial RedOx óptimo de 600 mV y / o en última instancia una cloración de 0,25 a 0,5 ppm.
- Pipetas: control de la altura y de la presión.
- Bebederos: control de la altura y del nivel del agua (2 cm max.)



EDAD EN DIAS		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TEMPERATURA	Radiantes bajos	35-36				32-34			28-30							
	Zona de vida	28	28	28	28	28	27-28	27-28	27-28	25-26						
	Ambiente	31-32	30-31	29-30	28-29	28-29	26-27	26-27	26-27							
HUMEDAD	%	50-60														
EQUIPO	Punto de agua	1 bebedero redondo para 60 aves / 1 pipeta para 8 aves								1 bebedero redondo para 80 aves / 1 pipeta para 8-10 aves						
	Punto de alimentación	1 punto de alimentación / 50-70 aves								6-8 cm / ave o 3-4m para 100 aves; 1 plato redondo / 6 aves*						
DENSIDAD	Pollitos/m²	25-30				12				5-8						
LUZ	Duración de luz para el tipo Classic, Flex y H1 (h)	24	24	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11-12**	8-12**
	Duración de luz para el tipo JV y F15 (h)	24	24	22	20	18	16	14	12	10	8	8	8	8	8	8
	Duración de luz para el tipo Premium (h)	24	22	22	20	20	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16
	Intensidad (lux)	60	60	60	60	40	30	20	15	10	10	10	10	5-10	5-10	5-10

* Espacio del comedero a ajustar en función del comportamiento de los animales.

** Si no se alcanza el peso ideal de los machos y\o de las hembras a los 7 dias, mantener una duración de luz suficiente en la 2ª semana de vida. En el caso de los galpones abiertos, adaptar de acuerdo a su experiencia.

© Hubbard