MANAGEMENT DES REPRODUCTRICES

Hubbard
YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT
BREEDING FOR YOU SINCE 1921

ÉLEVAGE DES POULETTES EFFICIENCY PLUS

Phase de poussinière réussie = Plus de 80 % des femelles du lot réceptives (« matures ») au moment de la stimulation lumineuse

N.B.: Gestion du lot à ajuster en fonction des conditions d'élevage locales (Type de bâtiment, climat)



1. Alimentation à volonté durant les 2 premières semaines de vie et jusqu'à 3 semaines d'âge si le poids à 2 semaines n'est pas atteint.
2. Diminution combinée de la durée de lumière et de l'intensité lumineuse sur les 2 premières semaines de vie: 24h lumière / 60 Lux → 8h lumière / 5 - 10 Lux.
3. Fournir 3 - 5 cm de perchoir par poulette ou 1 - 2 m² de plateforme pour 500 sujets à partir de 28 jours pour les entrainer à sauter aux nids.
4. Isoler les sujets les plus petits sujets à partir de 7 jours. Calibrer le lot entier à 4 semaines ou avant et créer des groupes de poids avec au moins 85 % d'homogénéité (CV = 7,5).

   Dans les 4 semaines après le calibrage ou avant 8 semaines, le parc avec les sujets les plus légers devra avoir atteint l'objectif de poids vif à 8 semaines afin de sécuriser le développement du squelette qui est presque terminé à cet âge.
5. Maintenir un temps de consommation de 45 - 60 minutes ; ajuster le programme d'alimentation en conséquence si la réglementation locale le permet.
6. Éviter toute perturbation de la croissance entre 18 - 22 semaines, surtout lors des changements de formule d'aliment et lors des vaccinations. Évaluer régulièrement la conformation corporelle et l'état d'engraissement.
7. Planifier la première stimulation lumineuse à partir de 154 jours. Si la maturité sexuelle est insuffisante, (moins de 80 % des femelles avec une ouverture pelvienne > 2 doigts (3 cm), condition de bréchet insuffisante, petite veine de gras) retarder la stimulation selon le guide d'élevage de la parentale Efficiency Plus.

Sur toute la période de poussinière :

- Veiller à une bonne distribution de l'aliment et de l'eau.
- Maintenir une bonne qualité de litière.
- Répondre aux exigences d'ambiance et qualité d'air pour un lot en bonne santé.

ÉQUIPEMENT ET DENSITÉ DURANT LA POUSSINIÈRE	
Densité *	6,0 sujets/m²
Radiants	1 pour 500 sujets
Abreuvoirs ronds	1 pour 80 sujets
Abreuvement - Pipette	1 pour 8-10 sujets
Mangeoires linéaires	15 cm/sujet (7,5 m/100 sujets)
Assiettes rondes	1 pour 12 sujets
Assiettes ovales	1 pour 13-14 sujets
Distributeur rotatif (Spin feeder)	1 pour 1500-1800 sujets
Temps de distribution de l'aliment	< 4 minutes

** La densité devra se conformer à la réglementation locale en vigueur dans tous les cas.*

i

Poster Distribution d'aliment

Objectifs de performance Parentale Efficiency Plus

Bulletin Calibrage

Guide d'élevage Parentale Efficiency Plus

© Hubbard - 2024-06