MANEJO DE LOS REPRODUCTORES DE CARNE

Hubbard
YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT
BREEDING FOR YOU SINCE 1921

RECRÍA DE LAS POLLITAS EFFICIENCY PLUS

Obtener un lote uniforme y listo para la puesta a las 25 semanas

NB: Las informaciones contenidas en este documento deben ser adaptadas según las particularidades y condiciones de la granja (Ej.: nave abierta/cerrada, clima, etc.)



0-4 semanas:	4-10 semanas:	10-15 semanas:	15-20 semanas:	20-25 semanas:
Lograr el arranque	**Desarrollar el esqueleto de los animales**	**Controlar el desarrollo muscular**	**Llevar las pollitas a la madurez sexual**	**Preparar las gallinas al inico de puesta**

- Alimento a voluntad las primeras 3 semanas.
  Ver el poster *"Arranque de los pollitos"* para más detalles sobre el periodo de 0 - 4 semanas.
- La reducción del fotoperiodo en las dos primeras semanas debe combinarse con la disminución de la intensidad de luz (24 h / 60 Lux ➔ 8 h / 5 - 10 Lux.) A adaptar para lograr el objetivo de peso a 4 semanas.
- Proporcionar 3 cm de espacio de percha por pollita a partir de la 4ª semana para entrenar a las pollitas para saltar a los nidos.
- 1a selección obligatoria (100 % de las aves pesadas) antes de las 4 semanas. Objetivo: Uniformidad superior al 85 % después de la selección.
  2ª selección útil si antes de las 15 semanas de edad la uniformidad es inferior al 80 %. Ver el boletín Técnico *"Selección de los Reproductores"*.
- Es importante que las aves más pequeñas alcancen el peso estándar a las 10 semanas para asegurar el desarrollo del esqueleto.
- No estimular con luz antes de 154 días en galpón oscuro y siempre que las gallinas no estén listas (peso, abertura pélvica, coloración de cresta y barbillas.) Uniformidad Objetivo: más del 80 % en el momento de la primera estimulación.
- Evitar el estancamiento del crecimiento durante el periodo de 20 - 25 semanas particularmente en el caso de la transferencia o cambio de alimento.
- Un lote bueno en puesta es el resultado de un buen manejo durante el periodo de recría.
  - ➔ Asegurar una buena calidad de distribución del alimento y del agua (cumplir las recomendaciones de equipamiento: poster *"Calidad de la distribucion del alimento"*.)
  - ➔ Mantenimiento regular de una buena cama.
  - ➔ Proveer un ambiente sano a las aves.

© Hubbard