


RECRIA DE MATRIZES EFFICIENCY PLUS

Para obter um lote uniforme, pronto para a postura as 25 semanas

N.B: As informações contidas neste documento devem ser adaptadas para condições específicas de recria (Ex. Galpão aberto / dark house, clima, etc.)



- ✓ Alimento a vontade nas primeiras 3 semanas. Veja o poster "Período inicial" para mais detalhes sobre 0 - 4 semanas.
- ✓ A redução do período de luz nas primeiras 2 semanas deve ser combinada com a diminuição da intensidade de luz (24 h / 60 Lux → 8 h / 5 - 10 Lux.) Pode ser adaptado para alcançar o peso alvo as 4 semanas de idade.
- ✓ Proporcionar 3 cm de poleiro / ave a partir da 4ª semana para treinar as fêmeas a saltar para os ninhos.
- ✓ 1ª seleção obrigatória (100 % das aves devem ser pesadas) antes da 4ª semana de idade. Objetivo: Uniformidade acima de 85 % depois da seleção. 2ª seleção antes de 15 semanas de idade é necessária em caso de uniformidade menor que 80 %. Veja o Boletim Técnico "Seleção".
- ✓ É importante que as aves menores alcancem o peso alvo as 10 semanas de idade para assegurar um bom desenvolvimento esquelético.
- ✓ Não estimular com luz antes dos 154 dias em galpões dark house e quando as fêmeas não estiverem sexualmente prontas (Peso corporal, abertura de ossos pélvicos, coloração da crista e barbelas.) Objetivo: Uniformidade alta maior que 80 % no momento do primeiro estímulo.
- ✓ Evitar o estancamento do crescimento durante o período de 20 - 25 semanas especialmente quando ocorre a mudança do tipo de ração.
- ✓ Um bom lote na postura está fortemente relacionado a um bom manejo durante o período de recria:
 - Assegurar uma boa distribuição de água e ração (seguir as recomendações para os equipamentos, Poster "Qualidade da distribuição da ração")
 - Manutenção de boa qualidade de cama.
 - Prover um ambiente saudável para as aves.